


## ESQUIZOFRENIA E COMORBILIDADE




Fonte: "Comprehensive Care of Schizophrenia" Liebeman, Murray

## MORBILIDADE- Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes

### N.º DE INTERNAMENTOS, RAM, 2009-2013



### N.º DE INTERNAMENTOS POR GRUPO ETÁRIO, RAM, 2011-2013




Fonte: Casa de Saúde Câmara Pestana


## FATOR DE RISCO

### FREQUÊNCIA DE CONSUMOS EM MEIO ESCOLAR, 3.º CICLO, RAM

#### GÉNERO FEMININO



#### GÉNERO MASCULINO



Fonte: INEM-2011

Legenda: PLV: Prevalência ao longo da vida - nível da experimentação;

P12M : Prevalência nos últimos 12 meses, antes da recolha dos dados - consumo recente;

P30D: Prevalência nos últimos 30 dias, à data da recolha dos dados - consumo atual.

## COMENTÁRIOS

- A esquizofrenia é um problema de saúde pública à escala mundial;
- Cerca de 26 milhões de pessoas têm esquizofrenia em todo o mundo (OMS);
- O seu início é geralmente precoce, afetando jovens entre os 16 e 25 anos;
- Todos os anos surgem entre 7 a 14 novos casos em cada 100 mil habitantes, com idades compreendidas entre os 15 e os 54 anos (OMS);
- As perturbações psiquiátricas são responsáveis por 40% dos anos vividos com incapacidade (AVI), destacando-se claramente entre as 10 principais causas gerais de incapacidade a esquizofrenia;
- Estima-se que as pessoas com esta doença vivam em média menos 10 anos do que a população geral;
- O consumo de drogas ou o "stress" agravam a expressão da doença;
- O consumo de tabaco nesta patologia situa-se entre 58 % e 88 %;
- Em Portugal, existem cerca de 100 mil doentes esquizofrénicos, ou seja, cerca de 1 % da população nacional, números que acompanham a prevalência a nível mundial;
- Tomando por referência o valor de prevalência nacional estima-se que o n.º de doentes com esquizofrenia na RAM seja 2.613.

Fonte: Plano Nacional de Saúde Mental-Orientações Programáticas