

**Assunto: Campanha de Vacinação Pandémica
– Grupos de Risco Prioritários –
Identificação e Vacinação das Pessoas
com Patologia Crónica Associada**

Para: Todos os médicos e enfermeiros a
desempenhar funções em Unidades/Serviços do
Sistema Regional de Saúde

A campanha de vacinação pandémica está em curso desde 26 de Outubro e tem por objectivos:

- Proteger os cidadãos mais vulneráveis devido:

- ao risco acrescido de desenvolverem complicações;
- à maior probabilidade de adquirirem infecção.

- Assegurar os serviços essenciais, vacinando os profissionais:

- de saúde;
- de outros sectores relevantes para a sociedade.

Considerando o nº crescente de casos na Região e a taxa de *letalidade* que ronda os 0,05% e que sucede a óbitos em pessoas com patologia crónica associada.

Considerando que do total de óbitos ocorridos no território nacional, até à presente data, 80% sobreveio em pessoas de risco.

Considerando a evidencia científica disponível que destaca os doentes crónicos como aqueles com maior probabilidade de virem a apresentar quadros severos pós-infecção pelo H1N1v2009, requerendo muitas vezes tratamento em unidades de cuidados intensivos.

Considerando o rateio de doses vacinais disponíveis que decorre de problemas de produção mundial.

O Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM, alerta para a necessidade de, rapidamente, serem **identificados todos os doentes crónicos** nas várias Unidades de Saúde do Sistema Regional de Saúde e que os mesmos sejam **credenciados, através de declaração médica (em anexo)** com a respectiva indicação de grupo de risco a fim de serem vacinados nos centros de

vacinação em actividade. Deverá ainda ser considerada a possibilidade de cada médico de família **organizar as suas próprias listas de pessoas de risco** a vacinar, desde que inscritas no Centro de Saúde, e apresentá-las aos Centros de Vacinação, não sendo necessário para essas qualquer outra declaração médica.

O Presidente



Maurício Melim

Anexo: Declaração médica para grupos de risco prioritário

DPSS/AC/ZL

2.ª fase		
Pessoas com: ³		Outros grupos
<65 anos	Qualquer idade	
<ul style="list-style-type: none"> • Asma moderada a grave, sob terapêutica crónica (pelo menos 3 meses, nos últimos 12 meses, com corticóides inalados em doses médias/altas ou sistémicos e/ou internamento por asma em 2009) 	<ul style="list-style-type: none"> • Obesidade mórbida actual <ul style="list-style-type: none"> · Crianças ≥ 10 anos: $IMC \geq 25$ · ≥ 10 anos e ≤ 18 anos: $IMC \geq 35$ · Adultos: $IMC \geq 40$ • Doença respiratória crónica desde a infância (ex: fibrose quística, displasia broncopulmonar) • Doença neuromuscular com compromisso da função respiratória (ex: distrofia neuromuscular) • Imunodepressão: transplantação, terapêuticas biológicas ou neoplasias hematológicas 	<ul style="list-style-type: none"> • Grávidas dos 2.º e 3.º trimestres (>12ª semana) • Coabitantes de crianças com idade < 6 meses portadoras de doença grave

B	Pessoas com: ³		Outros grupos
	<65 anos	Qualquer idade	
	<ul style="list-style-type: none"> • Diabetes mellitus em tratamento com insulina • Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) e outras doenças respiratórias crónicas com insuficiência respiratória crónica (ex: fibrose pulmonar, sequelas de tuberculose, pneumoconioses) • Doença cardiovascular: cardiopatia congénita, isquémica, hipertensiva, insuficiência cardíaca congestiva; excluindo hipertensão arterial isolada • Doença hepática: atresia biliar, cirrose, hepatite crónica com alteração da função hepática e/ou terapêutica anti-viral • Doença renal: insuficiência renal crónica, principalmente em doentes em diálise • Doença hematológica: hemoglobinopatias major • Asma (doentes não integrados no Grupo A) • Terapêutica mantida com salicilatos em pessoas com idade ≤ 18 anos (ex: doença reumática auto-imune, doença de Kawasaki) 	<ul style="list-style-type: none"> • Imunodepressão: primária, secundária (VIH), doentes não integrados no Grupo A 	<ul style="list-style-type: none"> • Profissionais de saúde em contacto directo com doentes • Profissionais que desempenham funções essenciais (2.ª linha) 12

C	Pessoas com: ³		Outros grupos
	<65 anos	Qualquer idade	
		<ul style="list-style-type: none"> • Doença crónica, à semelhança do recomendado para a vacinação contra a gripe sazonal • Obesidade ($IMC \geq 29$) 	<ul style="list-style-type: none"> • Crianças com idade ≤ 12 anos (ou ≤ 5 anos) • Dadores regulares de sangue 16 • Estudantes de medicina e enfermagem (anos clínicos) • Profissionais que desempenham funções essenciais (3.ª linha) 12

³ Excepcionalmente, outras pessoas portadoras de doença crónica grave, por analogia com as situações contempladas nos pontos anteriores;